



**Fiche de renseignements cliniques – Diagnostic  
microbiologique des infections urinaires**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

**DATE ET HEURE DE RECUEIL** : \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ : \_\_\_\_

**PRECONISATIONS POUR LE RECUEIL**

Prélèvement si possible le matin (il faut attendre au moins 4 heures entre la dernière miction et le recueil). Se laver les mains.

Faire une toilette soignée de la région vulvaire chez la femme et du gland chez l'homme avec la lingette désinfectante fournie par le laboratoire ou du savon antiseptique.

Éliminer le 1<sup>er</sup> jet dans les toilettes, uriner dans le flacon stérile présent dans le kit et le refermer soigneusement. N'ouvrir le flacon qu'au dernier moment.

Chez l'enfant, le sac collecteur ne doit pas être maintenu plus de 30 minutes, sinon le changer. Placer ensuite le sac collecteur dans le flacon stérile.

**IDENTIFIER LE FLACON (NOM ET PRENOM).**

L'acheminer avec l'ordonnance au laboratoire dans les 2h suivant le recueil. Il peut être conservé au réfrigérateur (2-8°C) 24h maximum.

**SIGNES FONCTIONNELS**

- Brûlures mictionnelles     Difficultés à uriner     Sang dans les urines  
 Mictions fréquentes     Fièvre     Douleurs lombaires/abdominales

**CONTEXTE CLINIQUE, ANTECEDENTS MEDICAUX**

Diabète :  Oui     Non    Préopératoire :  Oui     Non

Traitement immunosuppresseur :  Oui     Non



Antécédent récent (< 3 mois) de chirurgie prostatique ou vessie :  
.....



Règles au moment du recueil  
 Grossesse en cours : Terme le .....  
 Antécédent récent (< 3 mois) de chirurgie gynécologique ou de la vessie :  
.....

**MODALITE DU RECUEIL**

- Laboratoire     Domicile  
 Collecteur/Poche     Sonde     Dérivation urinaire externe (Bricker)

**TRAITEMENT EN COURS :**

Antibiotique en cours ?  Non  si Oui lequel : .....

Antibiotique prévu après le recueil ?  Non  si Oui lequel : .....

Contrôle ECBU après traitement antibiotique ?  Non  si Oui lequel : .....